

Frühsymptome sind solche Beschwerden, die zeitlich vor den Hauptsymptomen auftreten und eine nahende, aber noch nicht begonnene Psychose ankündigen.

- ▶ Reizbarkeit
- ▶ Nervosität
- ▶ Unruhe
- ▶ Schlafstörungen
- ▶ Appetitverlust
- ▶ Veränderung der Ess- oder Trinkgewohnheiten
- ▶ Konzentrationsstörungen
- ▶ Sozialer Rückzug
- ▶ Vernachlässigung der äußeren Erscheinung
- ▶ Veränderungen im Tagesablauf
- ▶ Leistungsabfall in Beruf oder Ausbildung
- ▶ Depressive Verstimmungen
- ▶ Einengung der Interessen
- ▶ Körperliche Beschwerden
- ▶ Schwächegefühl
- ▶ Misstrauen
- ▶ Aggressivität
- ▶ Geräuschempfindlichkeit
- ▶ Grundloses Unwohlsein
- ▶ Zwangsgedanken
- ▶ Unbestimmte Ängste
- ▶ Gefühl, beobachtet oder ausgelacht zu werden
- ▶ Schlechte Träume
- ▶ Plötzliche Ablehnung der Medikamenteneinnahme
- ▶ Plötzlich zunehmende Religiosität
- ▶ Zunehmende Konflikte mit anderen