

Os Estádios do Processamento e Modulação da Dor

Portugisich / portugais

Cérebro: Processamento da dor

Córtex:
Processamento racional e
coordenação local

Sistema límbico:
Processamento emocional

Tálamo:
Percepção da dor

Hipotálamo:
Reacções corporais (por ex.:
transpiração, subida da pressão
arterial)

Cerúleo (Locus coeruleus):
Rico em noradrenalina


Núcleos do Rafe:
Ricos em serotonina


Espinal-medula:

**Inibição da transmissão da
dor, através da serotonina
e noradrenalina**

Fibras nervosas
inibidoras da dor.

Fibras nervosas
condutoras da dor.





Fibromialgia^{1,5}



Dor de cabeça^{2,6}



Dor nas costas^{3,7}

O ciclo vicioso de uma depressão com dores (dores crónicas)



A terapia adequada com antidepressivos ajuda a quebrar o ciclo vicioso



1) Benkert O et al. Mirtazapine compared with paroxetine in major depression. J Clin Psychiatry 2000;61:9:656-663. 2) Schatzberg AF et al. Double-Blind, randomized comparison of mirtazapine and paroxetine in elderly depressed patients. Am J Geriatr Psychiatry 2002;10:541-550. 3) Samborski W et al. Open trial of mirtazapine in patients with fibromyalgia. Pharmacopsychiatry 2004;37:168-170. 4) Bendisen L, Jensen R. Mirtazapine is effective in the prophylactic treatment of chronic tension-type headache. Neurology 2004;62:1706-1711. 5) Schiltecatte M et al. Effects of mirtazapine on sleep polygraphic variables in major depression. Neuropsychobiology 2002;46:197-201. 6) Winokur A et al. Acute effects of mirtazapine on sleep continuity and sleep architecture in depressed patients: a pilot study. Society of Biological Psychiatry 2000;48:75-78. 7) Montejo AL et al. Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl3):10-21. 8) Arzneimittel-Kompendium der Schweiz 2006. Documed AG, Basel. 9) Frazer A. Pharmacology of antidepressants. J Clin Psychopharmacol 1997;17(Suppl1):25-185. 10) Guelli JD et al. Mirtazapine versus venlafaxine in hospitalized severely depressed patients with melancholic features. J Clin Psychopharmacol. 2001;21(4):425-431. **Gekürzte Fachinformation Remeron® WS:** Mirtazapin. **GF/WpE:** Filmtabletten zu 30mg resp. 45mg, Schmelztabletten zu 15mg resp. 30mg, Trinklösung zu 15mg pro ml. **I:** Episoden einer unipolaren Depression. **D:** 1x täglich 15 - 45mg, abends. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber Mirtazapin oder Hilfsstoffen. **WH/VM:** Agranulozytose, Epilepsie und organische Hirnsyndrome, Leber- oder Niereninsuffizienz, Herzerkrankungen, Hypotonie, Schwangerschaft, Stillzeit, Mikti-onsstörungen, akutes Engwinkelglaukom und erhöhter intraokularer Druck, Diabetes mellitus, Icterus, psychotische Symptome. Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen. **IA:** Cimetidin, ketoconazol, Alkohol, Benzodiazepine, MAO-Hemmer, Carbamazepin, Phenytoin, Warfarin. **Häufigste UAW:** Sedation, trockener Mund, Gewichtszunahme, gesteigerter Appetit, Obstipation. **Asthenie, Schwindel.** **VK:** Liste B. **P:** 10, 30, 100 und 3x100 Filmtabletten zu 30mg, 30 und 100 Filmtabletten zu 45mg, 6 und 30 Schmelztabletten zu 15mg, 30 und 96 Schmelztabletten zu 30mg, 66ml Trinklösung zu 15mg/ml. **ZI:** Organon AG, 8808 Pfäffikon. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Studien auf Anfrage erhältlich.