



Die Ebenen der Schmerzverarbeitung





Fibromyalgie ^{1,5}




Kopfschmerz ^{2,6}



Rückenschmerz ^{3,7}

Der Teufelskreis bei einer Depression mit Schmerzen (Chronifizierung der Schmerzen)



Die richtige antidepressive Therapie hilft den Teufelskreis zu durchbrechen

1) Thieme K et al. Comorbid depression and anxiety in fibromyalgia syndrome: relationship to somatic and psychosocial variables. *Psychosom Med* 2004;66(6):837-844. 2) Maizels M et al. Somatic symptoms in headache patients: the influence of headache diagnosis, frequency, and comorbidity. *Headache* 2004;44(10):983-993. 3) Ohayon MM and Schatzberg AF. Using chronic pain to predict depressive morbidity in the general population. *Arch Gen Psychiatry*. 2003;60(1):39-47. 4) Hasenbring M et al. Psychologische Mechanismen im Prozess der Schmerzchronifizierung. *Schmerz* 2001;15:442-447. 5) Samborski W et al. Open trial mirtazapine in patients with fibromyalgia. *Pharmacopsychiatry* 2004;37:168-170. 6) Bendtsen L and Jensen R. Mirtazapine Mirtazapine is effective in the prophylactic treatment of chronic tension-type headache. *Neurology* 2004;62(10):1706-11. 7) Brannon GE and Stone KD. The use of mirtazapine in a patient with chronic pain. *J Pain Symptom Manage* 1999;18(5):382-5. **Gekürzte Fachinformation Remeron®**
WS: Mirtazapin. **GF/WpE:** Filmtabletten zu 30mg resp. 45mg, Schmelztabletten zu 15mg resp. 30mg, Trinklösung zu 15mg pro ml. **I:** Episoden einer unipolaren Depression. **D:** 1x täglich 15 - 45mg, abends. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber Mirtazapin oder Hilfsstoffen. **WH/WM:** Agranulozytose, Epilepsie und organische Hirnsyndrome, Leber- oder Niereninsuffizienz, Herzkrankungen, Hypotonie, Schwangerschaft, Stillzeit, Miktionsstörungen, akutes Engwinkelglaukom und erhöhter intraokularer Druck, Diabetes mellitus, Ikterus, psychotische Symptome. Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen. **IA:** Cimetidin, Ketoconazol, Alkohol, Benzodiazepine, MAO-Hemmer, Carbamazepin, Phenytoin, Warfarin. **Häufigste UAW:** Sedation, trockener Mund, Gewichtszunahme, gesteigerter Appetit, Obstipation, Asthenie, Schwindel. **VK:** Liste B. **P:** 10, 30, 100 und 3x100 Filmtabletten zu 30mg, 30 und 100 Filmtabletten zu 45mg, 6 und 30 Schmelztabletten zu 15mg, 30 und 96 Schmelztabletten zu 30mg, 66ml Trinklösung zu 15mg/ml. **Zf:** Organon AG, 8808 Pfäffikon. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Studien auf Anfrage erhältlich.

